



Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE WELFARE
PROGRAMMAZIONE

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it

welfare@pec.regione.lombardia.it

AI DIRETTORI GENERALI ATS
AI DIRETTORI GENERALI ASST
AI DIRETTORI GENERALI FONDAZIONI
IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO
AI LEGALI RAPPRESENTANTI IRCCS
PRIVATI - OSPEDALI CLASSIFICATI
CASE DI CURA ACCREDITATE

LORO SEDI

Oggetto : TRASMISSIONE DECRETO 9583

Con comunicazione inviata in data 10/08/20 pari oggetto , è stata inoltrato il Decreto DGW n° 9583 del 6/8/20. Nel Decreto di cui sopra è stata inserita , per mero errore materiale , la versione dell'allegato 1a non ancora contenente le ultime osservazioni formulate dal CTS .

Si allega la versione aggiornata e corretta dell'allegato 1a che sostituisce la precedente . Seguirà nuova emanazione del nuovo Decreto di rettifica che verrà prontamente inviato. Si chiede alle ATS di trasmettere la presente comunicazione alle Strutture Private accreditate di riferimento

Scusandoci per il disagio si porgono cordiali saluti

IL DIRIGENTE

MARCO SALMOIRAGHI

Allegati:

File Protezione individuale (DPI).pdf

Referente per l'Istruttoria della pratica: Marco Salmoiraghi Tel. 02/6765. 2197

Allegato 1

Indicazioni per la dotazione di Dispositivi Medici (DM) e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Le presenti raccomandazioni sono da intendersi ad interim, in quanto suscettibili di aggiornamento in relazione all'evoluzione del quadro epidemico ed organizzativo.

Si ritiene utile il richiamo costante alle misure universali di prevenzione e contenimento del rischio quali fattori di protezione "chiave":

- ✓ sanificare frequentemente le mani con soluzioni alcoliche se le mani non sono visibilmente sporche o con acqua e sapone se le mani sono sporche;
- ✓ evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca;
- ✓ tossire o starnutire coprendosi con il braccio piegato o un fazzoletto, che poi deve essere immediatamente eliminato;
- ✓ lavare le mani dopo aver eliminato i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, degli occhi, delle mani e del corpo;

In relazione alle specifiche misure di protezione individuale degli operatori sanitari, ferma restando la raccomandazione di utilizzo continuativo della mascherina chirurgica durante tutto l'orario di lavoro, si fornisce, in forma tabellare, un aggiornamento delle indicazioni per l'utilizzo dei DPI, tenendo conto sia dell'assetto organizzativo in Fase 2 che del livello di intensità di cura per pazienti affetti da COVID-19.

Nella tabella seguente, in ragione delle diverse fasi evolutive della patologia e dei limiti attuali degli accertamenti diagnostici, sono state utilizzate le seguenti definizioni già riportate nella DGR 3115/20:

- Pazienti certamente COVID: con tampone/BAL positivo,
- Pazienti probabilmente COVID: con tampone/BAL negativo o in attesa di esito, ma con clinica/anamnesi/imaging suggestive-positive,
- Pazienti possibilmente COVID FREE: tampone negativo, anamnesi e clinica negative, imaging negativo.

Nella DGR di cui sopra viene altresì precisato che i pazienti "probabilmente COVID" così come descritti sopra, devono essere mantenuti in aree di osservazione o aree grigie, in stanze singole, nelle quali è opportuno che il personale osservi le medesime misure di protezione e i medesimi comportamenti raccomandati nelle AREE COVID.

TIPOLOGIA DI AREA	TIPOLOGIA DI PAZIENTI	LIVELLO DI INTENSITA' DI CURA	DM/DPI	BOX
AREE DI DEGENZA COVID-19 E AREE DI PRONTO SOCCORSO COVID-19 + AREE DI OSSERVAZIONE o AREE GRIGIE E AREE GRIGIE DI PRONTO SOCCORSO	Pazienti certamente COVID (con tampone/BAL positivo) o Pazienti probabilmente COVID (con tampone/BAL negativo o in attesa di esito, ma con clinica/anamnesi/imaging suggestive/positive)	Unità Operative COVID-19 ad Alta intensità di cura (Terapia Intensiva)	<ul style="list-style-type: none"> • FFP2/FFP3 • camice impermeabile + copertura del capo e del collo + calzare (in alternativa, tuta impermeabile) • Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera • Guanti 	1
		Unità Operative COVID-19 a Media intensità di cura (reparti con prevalenza di pazienti in NIV, CPAP e Assistenza Ventilatoria): esposizione ad aerosol	<ul style="list-style-type: none"> • FFP2/FFP3 • camice impermeabile + copertura del capo e del collo + calzare (in alternativa, tuta impermeabile) • Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera • Guanti 	2
		Unità Operative COVID-19 a Bassa intensità di cura (reparti con pazienti non in assistenza respiratoria e pazienti in ossigenoterapia): esposizione a droplet	<ul style="list-style-type: none"> • FFP2 • camice idrorepellente + copertura capo • Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera • Guanti 	3
AREE DI PRONTO SOCCORSO COVID-19 FREE	Pazienti possibilmente COVID FREE (tampone negativo, anamnesi e clinica negative, imaging negativo)	qualsiasi	<ul style="list-style-type: none"> • FFP2 • Ordinaria divisa da lavoro • Guanti (in caso di esposizione ad aerosol o droplet fare riferimento ai box 2 o 3)	4
AREE DI DEGENZA COVID-19 FREE	Pazienti possibilmente COVID FREE (tampone negativo, anamnesi e clinica negative, imaging negativo)	qualsiasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mascherina chirurgica • Ordinaria divisa da lavoro • Guanti (in caso di esposizione ad aerosol o droplet fare riferimento ai box 2 o 3)	5

SALE OPERATORIE	Qualsiasi	Tutto il personale in sala operatoria nel setting chirurgico è da considerarsi esposto ad aerosol	<ul style="list-style-type: none"> • FFP2/FFP3 • camice impermeabile + copertura del capo + sovrascarpe • Guanti • Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera 	6
PUNTI PRELIEVO	Qualsiasi	Non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Mascherina chirurgica • camice idrorepellente • Guanti • Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera 	7
AMBULATORI	Pazienti con sintomi suggestivi per COVID-19 Pazienti con raccordo anamnestico personale e/o familiare suggestivo per COVID-19	Non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • FFP2 • camice idrorepellente • Guanti • Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera 	8
	Pazienti senza sintomatologia suggestiva per COVID-19	Non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Mascherina chirurgica • Ordinaria divisa da lavoro • Guanti • (in caso di esposizione ad aerosol o droplet fare riferimento ai box 2 o 3) 	9