



"Ospedale Sant'Anna di Como"
Presidio di San Fermo della Battaglia

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

Dipartimento dei Servizi

UOC Patologia Clinica - Laboratorio Analisi

**Presidio Ospedaliero Sant'Anna
San Fermo della Battaglia (CO)**

Direttore f.f. : dr. Michelarcangelo Partenope

Tel 031.585.9093

Segreteria 031.585.9094

segreteria.laboratorio.osa@asst-lariana.it

michele.partenope@asst-lariana.it

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DELLE URINE DELLE 24 ORE IN CONTENITORE ACIDIFICATO

Elenco dosaggi da eseguire su urine acidificate:

Acido omovanillico – acido 5-idrossiindolacetico – acido vanilmandelico – metanefrine

Iniziare la raccolta al mattino, dopo aver svuotato la vescica alla solita ore (per esempio alle 7.00) e, da quel momento in poi, raccogliere tutte le urine successive durante la giornata e la notte sino alla stessa ora del giorno successivo. Durante la raccolta evitare di esporre il contenitore alla luce e a temperature superiori a 10°C.

NB. Per il dosaggio di acido-5idrossiindolacetico, vanilmandelico, metanefrine a partire dalle 48 ore precedenti l'inizio e per tutta la durata della raccolta delle urine è necessario seguire una dieta priva di banane, vaniglia, cioccolato, caffè, tè, ananas, kiwi, noci.

Urinare in un bicchiere di carta e travasare, assolutamente **NON** urinare direttamente nel contenitore

**ATTENZIONE IL CONTENITORE CONTIENE ACIDO CLORIDRICO 6N
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**



Avvertenze

Indicazioni di pericolo: H 290-314-335

L'acido cloridrico è corrosivo e, se tenuto a contatto con la pelle provoca ustioni; se inalato provoca irritazioni alle vie respiratorie; se portato a contatto con gli occhi provoca gravi lesioni oculari.

Misure di primo soccorso

Contatto con la pelle: togliere immediatamente gli indumenti contaminati e lavare con acqua le zone del corpo venute a contatto

Contatto con gli occhi: lavare abbondantemente con acqua a palpebre aperte; poi proteggere gli occhi con fazzoletto pulito

Ingestione: sciacquare la bocca con acqua senza deglutire, non provocare il vomito e rivolgersi subito al Medico/Centro antiveleni; somministrare acqua con albume, NON bicarbonato.

Inalazione: respirare in ambiente aerato.

NB: in caso di persistenza o aggravamento dei sintomi contattare il medico/centro antiveleni.

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA

QUANTITA' DI URINA RACCOLTE: mL

MOD 24h HCL

Ultimo aggiornamento: settembre 2020