



"Ospedale Sant'Anna di Como"
Presidio di San Fermo della Battaglia

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

Dipartimento dei Servizi

UOC Patologia Clinica - Laboratorio Analisi

Presidio Ospedaliero Sant'Anna

San Fermo della Battaglia (CO)

Direttore f.f. : dr. Michelarcangelo Partenope

Tel 031.585.9093

Sekreteriat 031.585.9094

segreteria.laboratorio.osa@asst-lariana.it

michele.partenope@asst-lariana.it

UDHËZIMET PËR MBLEDHJEN E URINËS GJATË 24 ORËVE NË ENËN ME ACIDITET

Dozat që duhet përdorur MBI urinën me aciditet:

Acid homovanillik - acid oxalik - acid 5-hydroxyindolacetik - acid vanilmandelik - metanefrinë

Filloni mbledhjen e urinës në mëngjes, pasi të keni zbrazur fshikëzën e urinës në orën e zakonshme (për shembull, në orën 7.00) dhe, që nga ai moment e në vazhdim, të grumbulloni të gjitha urinën, gjatë gjithë ditës dhe gjatë gjithë natës, deri në të njëjtën orë të ditës së nesërme. Gjatë mbledhjes shmangni ekspozimin e enës që përmban urinën ndaj dritës dhe ndaj temperaturave me të larta se 10 ° C.

Kujdes: Për dozat e acidit 5-hidroksi-indolacetik, vanilmandelik dhe metanefrinës, duke filluar nga 48 orë para mbledhjes së urinës dhe për tërë kohëzgjatjen e mbledhjes së saj, është e nevojshme të ndiqni një dietë gjatë së cilës nuk mund të hani banane, vanilje, çokollatë, kafe, çaj, ananas, kivi, arra.

Në fillim urinoni në një gotë letre dhe pastaj përmbajtjen kalojeni në enë, absolutisht MOS urinoni drejtpërdrejt në enë.

**KUJDES: ENA PËRMBAN ACID KLOORHIDRIK 6N
MBAJENI NË VENDE JASHTË RREZIKUT PËR FËMIJËT**



Paralajmërimet

Sinjalet e rrezikut: H 290-314-335

Acidi klorhidrik është gërryes dhe, nëse e mbani në kontakt me lëkurën, shkakton djegie; nëse e thithni ai shkakton acarim në rrugët e frymëmarrjes; nëse e vini në kontakt me sytë ai shkakton dëmtimin serioz të syve.

Masat e ndihmës së parë

Kontakti me lëkurën: hiqni menjëherë veshjet e kontaminuara dhe lani me ujë të bollshëm zonat e trupit që kanë rënë në kontakt;

Kontakti me sytë: lani me ujë të bollshëm qepallat e hapura të syve; pastaj mbroni sytë me një shami të pastër;

Gëlltitje: shpëlajeni gojën me ujë por pa e gëlltitur, mos provokoni të vjella dhe drejtojeni menjëherë Mjekut ose Qendrës kundër Helmeve; përdorni ujë të përzier me të bardhë veze, **JO** sodë buke;

Thithja: merrni frymë në një mjedis të ajrosur.

KUJDES: në rast të vazhdimit ose të keqësimit të simptomave kontaktoni menjëherë Mjekun ose Qendrën kundër Helmeve.

MBIEMRI

EMRI

DITA E LINDJES

SASIA E URINAVE TË MBLEDHURA : ml

FORMULARI I 24 ORËVE HCL

Ultimo aggiornamento: settembre 2020