



ISTRUCȚII PENTRU RECOLTAREA URINEI DE 24 DE ORE ÎN CONTENITOR ACIDIFIAT

Lista dozelor de efectuat pentru urinele acidificate:


Acid homovanilic – acid oxalic – acid 5-hidroxiindolacetic – acid vanilmandelic – metanefrine

A se începe recoltarea de dimineață (de exemplu la ora 7:00), pacientul urinează și nu reține această primă urină, apoi colectează toate emisiunile de urină din acea zi, până la aceeași oră (la care a început), din ziua următoare. În timpul recoltării a se evita expunerea recipientului la lumină și temperaturi mai mari de 10⁰ C.

ATENȚIE! Pentru dozele de acid 5-hidroxiindolacetic, acid vanilmandelic și metanefrine, cu 48 de ore înainte, nu se pot consuma următoarele alimente: banane, vanilie, ciocolată, cafea, ceai, ananas, kiwi, nuci.

A se urina într-un pahar de hârtie și apoi a se vărsa în recipient. Sub nicio formă a **NU** se transfera direct în recipient.

**ATENȚIE RECIPIENTUL CONȚINE ACID CLORHIDRIC 6N
A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR**



Avertismente

Indicații de pericol: H 290-314-335

Acidul clorhidric este coroziv, dacă intră în contact cu pielea, poate provoca arsuri; dacă este inhalat poate provoca iritații ale căilor respiratorii; în contactul cu ochii poate provoca leziuni oculare grave.

Măsuri de prim ajutor

Contactul cu pielea: îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați cu apă zona corpului care a intrat în contact cu acidul;

Contactul cu ochii: clătiți cu apă din abundență ținând ochii deschiși, apoi protejați cu un șervețel curat;

Ingestia: clătiți gura cu apă, fără a o înghiți, nu vă provocați vomă, îndreptați-vă cât mai repede către un Medic/Centru de Intoxicare; a se administra apă cu albuș de ou, **NU** bicarbonat;

Inhalare: Respirați într-un ambient bine aerisit;

NB: În caz de persistență sau agravare a simptomelor contactați medicul/centru de intoxicare.

NUME PRENUME

DATA DE NAȘTERE

CANTITATEA DE URINĂ RECOLTATĂ: mL

MOD 24h HCL