



MATERIALE IN ESAME: URINE – Francese

Matériel d'examen pour la récolte des urines.

CULTURE D'URINE

Utiliser pour la récolte des urines un récipient stérile avec couvercle. Récolter les premières urines du matin ou attendre 3 heures après la première urine.

1) HOMME

- Se laver les mains avec de l'eau et du savon et les sécher.
- Rétracter le prépuce, laver avec de l'eau et du savon l'orifice de l'urètre et la région environnante, rincer.
- En gardant le prépuce rétracté, émettez un premier jet d'urine sans le récolter.
- Recueillez dans le récipient stérile le second jet d'urine en faisant attention à ne pas toucher les bords et l'intérieur du récipient.
- Fermer le récipient.
- Déposer l'échantillon d'urine au centres de prélèvements avant 9h30.

2) FEMMES

- Se laver les mains avec de l'eau et du savon et les sécher.
- Laver les organes génitaux externes avec de l'eau et du savon et sécher.
- Ecarter les grandes lèvres et émettez un premier jet d'urine
- Recueillez dans le récipient stérile le second jet d'urine en faisant attention à ne pas toucher les bords et l'intérieur du récipient.
- Fermer le récipient
- Déposer l'échantillon d'urine au centre de prélèvements avant 9h30.

3) CATHETER (sonde)

- Utiliser pour la récolte, un récipient avec un bouchon à visser.
- Clamper la sonde (cathéter) à l'aide d'une pince immédiatement en aval de la jonction avec le sac, pendant au moins une heure.
- Désinfectez une partie du cathéter juste en dessous de la jonction avec le tube de liaison ou désinfectez le récipient servant aux récoltes d'échantillons.
- Jetez quelques cc d'urine et récoltez dans un récipient stérile la seconde partie des urines en faisant attention à ne pas toucher les bords de la même.
- Déposer l'échantillon ainsi recueilli le plus rapidement possible et si cela n'est pas possible conservez-le dans le frigo en ne dépassant pas les 12 heures.

4) NOURRISSON ET ENFANTS

- Utilisez pour la récolte un petit sachet en plastique autocollant disponible dans les pharmacies.
- Nettoyer soigneusement la peau de la région sous-pubienne, des organes génitaux externes et périnataux avec une solution savonneuse, rincer à plusieurs reprises et sécher bien.
- Appliquer le sachet en le faisant adhérer à la région sous-pubienne et le périnée.
- Retirez le sachet dès que l'urine est arrivée et scellez le sachet avec soin.
- Rangez-le dans un récipient stérile.
- Ne laissez pas le sachet en place plus de 45-60 minutes. Au besoin remplacez le sachet.
- Déposer l'échantillon au centre de prélèvements avant 9h30.

EXAMEN CHIMIQUE-PHYSIQUE ET MICROSCOPIQUE

- Il est recommandé de fournir un échantillon du matin après une bonne nuit de repos, recueillies avec le milieu du courant de mode (voir la culture d'urine)
- Déposer l'échantillon au centre de prélèvements avant 9h30.



"Ospedale Sant'Anna di Como"
Presidio di San Fermo della Battaglia

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

Dipartimento dei Servizi

UOC Patologia Clinica - Laboratorio Analisi

**Presidio Ospedaliero Sant'Anna
San Fermo della Battaglia (CO)**

Direttore f.f. : dr. Michela Arcangelo Partenope

Tel 031.585.9093

Segreteria 031 585.9094

segreteria.laboratorio.osa@asst-lariana.it

michele.partenope@asst-lariana.it

RECHERCHE ANTIGENE PNEUMOCOQUE

- Il est recommandé de délivrer un échantillon prélevé dans la matinée, après une nuit de repos.
- Recueilli selon la technique du milieu du jet (cfr culture d'urine)
- L'échantillon doit être déposé au centre de prélèvements avant 9h30.
- L'échantillon peut être stocké à une température ambiante pendant 24 heures ou entre 2° et 8°.

RECHERCHE : mycoplasme s urogénitaux Chlamadya trachomatis

- Il est recommandé de délivrer un échantillon prélevé dans la matinée, après une nuit de repos.
- Recueilli selon la technique du milieu du jet (cfr culture d'urine)
- L'échantillon doit être déposé au centre de prélèvements avant 9h30.
- L'échantillon peut être stocké entre 2° et 8° pendant 4 heures.

RECHERCHE : Mycobactéries

- Recueillir la production d'urine après une nuit de repos dans une éprouvette FALCON de 50 ml (disponible au point de prélèvements),
- La production d'urine après une nuit de repos.
- L'échantillon doit être déposé au centre de prélèvements avant 9h30.

N.B : L'analyse appropriée sera effectuée sur 3 échantillons prélevés sur 3 jours différents.

RECHERCHE : Trichomonas vaginalis (pour les hommes)

- Recueillir la première urine de la matinée.
- L'échantillon doit être déposé au centre de prélèvements avant 9h30.

RECOLTE D'URINE POUR LA MICROALBUMINERIE (après 8 heures de repos)

- Recueillir la première urine de la matinée.
- L'échantillon doit être déposé au centre de prélèvements avant 9h30.

RECOLTE D'URINE DE (24 heures) POUR EXAMENS DIVERS

- Recueillir toutes les urines de 24h à partir de 7h (Ne pas recueillir les urines du réveil du premier jour) jusqu'au lendemain 7h (recueillir les urines du réveil).
 - Durant la récolte des urines successives, les conserver dans l'obscurité à une température de 2° à -8°
- N.B : L'oubli de récolte d'une part d'urine, si minime soit-elle, compromettra le résultat de l'analyse.**

Ultimo aggiornamento: settembre 2020