

# Vaccinazioni in gravidanza

- Nel corso della gravidanza **sono raccomandate le vaccinazioni contro difterite, tetano, pertosse (dTpa) e influenza** (se la gestazione si verifica nel corso di una stagione influenzale), che **devono essere ripetute ad ogni gravidanza**
- Anche se la donna sia già stata vaccinata o sia in regola con i richiami decennali o abbia avuto la pertosse.

**La pertosse contratta dal neonato nei primi mesi di vita può essere molto grave o persino mortale e la fonte di infezione è frequentemente la madre.**

Il periodo raccomandato per effettuare la vaccinazione è il terzo trimestre di gravidanza, ( 28– 37sett.) al fine di consentire alla gestante la produzione di anticorpi sufficienti e il conseguente passaggio transplacentare. Il vaccino dTpa si è dimostrato sicuro sia per la donna in gravidanza sia per il feto.

La vaccinazione anti-influenzale è raccomandata e offerta gratuitamente alle donne che all'inizio della stagione epidemica dell'influenza si trovino nel secondo o terzo trimestre di gravidanza.



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lariana

# Per approfondire ...

- [Piano nazionale di prevenzione vaccinale \(PNPV\) 2017-2019](#)
- [Circolare 21 novembre 2018 - Vaccinazioni raccomandate per le donne in età fertile e in gravidanza](#)
- [Sito tematico Vaccinazioni](#)