


ASST LARIANA

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO – OSTETRICA – CATEGORIA D

PROVA SCRITTA **1**

- 1) Se assunti durante il puerperio i seguenti farmaci passano nel latte materno ECCEPPO:**
- A) eparina
 - B) acido acetilsalicidico
 - C) tetracicline
 - D) eritromicina
- 2) In corso di riscontro di ASCUS allo screening con PAP TEST è indicata:**
- A) esecuzione colposcopia
 - B) ripetizione pap test dopo 6 mesi
 - C) HPV test
 - D) PAP TEST e HPV test dopo 3 mesi
- 3) La causa principale di mortalità neonatale è data da:**
- A) malformazioni congenite
 - B) prematurità
 - C) danni ostetrici al feto
 - D) asfissia
- 4) In che percentuale si riscontra "batteriuria asintomatica" in gravidanza?**
- A) 15 – 25%
 - B) 4 - 7%
 - C) 17 - 20%
 - D) 40 - 45%
- 5) Se il Cervico carcinoma si estende oltre la cervice, infiltrando l'endometrio, il parametrio, la vagina, senza interessare la pelvi, esso appartiene allo stadio:**
- A) II a
 - B) II b
 - C) III b
 - D) III a
- 6) Durante la gravidanza il fibrinogeno:**
- A) aumenta del 100%
 - B) aumenta del 50%
 - C) aumenta soltanto di poco
 - D) rimane inalterato
- 7) Il P.I.C.O. è:**
- A) è la metodologia per impostare il quesito clinico
 - B) è la metodologia della disinfezione dei ferri chirurgici
 - C) è la fase della ricerca che valuta il livello scientifico degli articoli
 - D) nessuna delle precedenti
- 8) Il corpo luteo raggiunge la massima attività:**
- A) 10 giorni dopo l'ovulazione
 - B) 15 giorni dopo l'ovulazione
 - C) una settimana dopo l'ovulazione
 - D) una settimana prima dell'ovulazione



9) La manovra di McRoberts:

- A) è utilizzata nella distocia di spalle
- B) può essere effettuata dall'Ostetrica\o
- C) consiste nel flettere le cosce sull'addome e divaricare le gambe
- D) tutte le precedenti

10) Si definisce fase latente prolungata nella nullipara, quando l'attività prodromica non esita in travaglio attivo dopo:

- A) 6 ore
- B) 12 ore
- C) 15 ore
- D) 20 ore

11) In gravidanza il numero dei leucociti:

- A) rimane invariato
- B) diminuisce apparentemente a causa della emodiluizione
- C) aumenta soprattutto a carico della frazione neutrofila
- D) aumenta soprattutto a carico della funzione linfocitaria

12) La frequenza cardiaca nei primi giorni del puerperio è di solito:

- A) aumentata
- B) diminuita
- C) rimane invariata alla gravidanza
- D) uguale a quella che esisteva prima della gravidanza

13) Sono segni materni e funicolari del 3° stadio del parto:

- A) segno di Ahlfeld, di Kustner, di Ritgen
- B) segno di Ahlfeld, di Credè, di Kustner
- C) di Kustner, di Schroder, di Ahlfeld
- D) segno di Brand-Andrews, di Credè, di Kustner

14) In gravidanza l'assorbimento gastro-intestinale di ferro sembra essere:

- A) aumentato
- B) diminuito
- C) invariato
- D) dipende dalla parità

15) L'utero presenta i seguenti strati dall'esterno verso l'interno:

- A) perimetrio, endometrio, fibre longitudinali, strato plessiforme, fibre circolari
- B) perimetrio, fibre circolari, fibre longitudinali, strato plessiforme, endometrio
- C) fibre longitudinali, perimetrio, strato plessiforme, fibre circolari, endometrio
- D) perimetrio, fibre longitudinali, strato plessiforme, fibre circolari, endometrio

16) La Giornata Internazionale dell'Ostetrica\o è:


- A) 5 maggio
- B) 1 novembre
- C) 5 gennaio
- D) 25 novembre

17) Chlamidia trachomatis è:

- A) un virus
- B) un batterio intracellulare obbligato
- C) causa di sepsi neonatale
- D) protozoo

18) In gravidanza la pressione arteriosa:

- A) aumenta nel primo trimestre
- B) aumenta nel secondo trimestre
- C) diminuisce fino alla 24 settimana circa
- D) diminuisce in prossimità del parto



PROVA ESTRATTA

4/8/12 Anna Butti
11/8/12 Castelli Arca

19) L'ammissione al travaglio, in assenza di controindicazioni specifiche, deve essere offerta a tutte le donne che hanno già partorito mediante taglio cesareo, ma in caso di induzione bisogna considerare che il rischio di rottura d'utero:

- A) raddoppia con l'utilizzo di ossitocina
- B) aumenta con l'aumentare del BMI
- C) si riduce con l'aumentare dell'epoca gestazionale
- D) non è influenzato dall'induzione

20) La Norma di legge considera come peso movimentabile massimo dal lavoratore femminile un peso di:

- A) 20 Kg
- B) 10 Kg
- C) 23 Kg
- D) 15 Kg

21) Che cosa si intende col termine bonding:

- A) è la preoccupazione materna primaria
- B) relazione dinamica tra due persone che cercano entrambe di soddisfare i loro bisogni
- C) attaccamento del bambino al seno entro la prima ora di vita
- D) allattamento a richiesta

22) L'ottica negativa del concetto di responsabilità è

- A) l'impegno a mantenere un comportamento congruo e corretto. E' lo stimolo ad attivarsi ed ad assumere iniziative di volta in volta necessarie
- B) l'impegno a confidare nelle attività svolte dai professionisti, colleghi del medesimo turno
- C) il dovere dell'ostetrica\o a comparire di fronte al Collegio Professionale
- D) l'attitudine ad essere chiamati a rispondere ad una qualche Autorità di una condotta riprovevole

23) Definizione di Sinclitismo

- A) quando la sutura sagittale fetale è in asse con il rachide cervicale e parallela alla linea direttrice del bacino che passa dal punto d'incrocio fra il diametro obliquo sinistro e destro dello stretto superiore
- B) la sutura sagittale fetale è deviata verso il sacro ed il parietale anteriore si sposta dietro il pube
- C) quando la sutura sagittale fetale è in asse con il rachide cervicale fetale e parallela alla linea direttrice del bacino che passa dal punto di incrocio fra il diametro antero-posteriore e il diametro trasverso dello stretto superiore
- D) la sutura sagittale fetale è deviata verso il PUBE ed il parietale anteriore si sposta dietro il SACRO

24) Quale è l'incidenza dei neonati con Ph < 7 riportata come indicatore di riferimento?

- A) 0,1%
- B) 0,2 - 0,5 %
- C) 0,3 - 0,7 %
- D) 1%

25) Quale è il valore di INDICATORE ATTESO per i trigger materni in area ostetrica?

- A) 1%
- B) 3%
- C) 5%
- D) 10%

26) La terapia con VALACICLOVIR iniziata precocemente (entro le 7 settimane dalla diagnosi di infezione) è il grado di ridurre il rischio di trasmissione verticale del:

- A) 20%
- B) 50%
- C) 70%
- D) 100%



4/8/22 *Amabattò*
4/8/22 *Castelli Petrucci*

PROVA ESTRATTA

27) Infezione da CMV in gravidanza: Indica quale delle seguenti affermazioni NON è corretta

- A) il rischio di trasmissione è influenzato dall'epoca di gravidanza
- B) il rischio di trasmissione è minore in caso di infezione NON primaria
- C) il rischio di sintomi /sequele è uguale in caso di infezione primaria e non primaria
- D) il fenotipo clinico dipende dalla viremia materna

28) Quale dei seguenti esami NON è previsto in fase pre concezionale?

- A) Emogruppo più test di Coombs indiretto
- B) Toxo test
- C) VIDRL-TPHA
- D) Emocromo

29) Per quale valore di glicemia a digiuno nel primo trimestre è possibile fare diagnosi di Diabete Manifesto se riconfermato in due misurazioni?

- A) ≥ 126 mg/dl
- B) ≥ 110 mg/dl
- C) ≥ 95 mg/dl
- D) Nessuno dei precedenti

30) Per quali dei seguenti fattori di rischio è indicata l'esecuzione della curva da carico precoce (16-18 sett.) In gravidanza?

- A) età > 35 anni
- B) precedente macrosomia
- C) familiarità
- D) BMI > 30




4/8/22 *Anna Batti*
4/8/22 *Castelli Maria B*

PROVA ESTRATTA

ASST LARIANA

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO – OSTETRICA – CATEGORIA D

PROVA SCRITTA 2



1) La causa principale di mortalità neonatale è data da:

- A) malformazioni congenite
- B) prematurità
- C) danni ostetrici al feto
- D) asfissia

2) Il test di Coombs a che epoca è raccomandato?

- A) all' inizio della gravidanza solo alle donne Rh negative
- B) all'inizio della gravidanza a tutte le donne
- C) all'inizio della gravidanza e a 28 w a tutte le donne
- D) dalla 28° settimana

3) La supplementazione di Ferro è indicata:

- A) se i livelli dell'emoglobina (HB) sono <11g/dL nel 1° trimestre e 10,5 g/dL da 28 settimane di gestazione
- B) sempre, a scopo profilattico
- C) se la donna ha carenza di folati e vitamina B12
- D) se la donna ha carenza di vitamina B12

4) Secondo la linea guida "Hypertension in pregnancy" del National Collaborating Centre for Women's and Children's Health (NCC-WCH), l'ipertensione in gravidanza viene definita lieve quando i valori della pressione diastolica e sistolica sono rispettivamente compresi tra:

- A) tra 90 / 97 mmHg, tra 146 / 153 mmHg
- B) tra 85 / 90 mmHg, tra 145 / 147 mmHg
- C) tra 90 / 99 mmHg, tra 140 / 149 mmHg
- D) tra 94 / 96 mmHg, tra 151 / 159 mmHg

5) L'impatto su inizio e durata dell'allattamento al seno è stato associato positivamente a

- A) distribuzione di materiale scritto
- B) piccoli gruppi di donne in gravidanza e condotti in maniera informale
- C) corsi condotti indifferentemente con/ o senza modalità interattiva
- D) materiale scritto, da solo o combinato con corsi senza modalità interattiva

6) Negli screening non invasivi quale è la percentuale che definisce un alto o basso rischio?

- A) 1/250
- B) 1/200
- C) 1/500
- D) 1/150

7) Quando è raccomandata la vaccinazione antiinfluenzale?

- A) sempre nei periodi stagionali
- B) nei periodi stagionali ma solo nel terzo trimestre
- C) nei periodi stagionali ma solo nel secondo trimestre
- D) non è raccomandata

4/8/2022 Anna Betti
4/08/2022 Castellani Anna Paola

PROVA NON ESTRATTA



- 8) Da che epoca è raccomandata la misurazione della sinfisi fondo?**
A) dalla 24 settimana
B) dalla 26 settimana
C) dalla 28 settimana
D) dalla 32 settimana
- 9) Quale dei seguenti muscoli fa parte dell'elevatore dell'ano:**
A) piramidale
B) piriforme
C) pubo-coccigeo
D) bulbo-cavernoso
- 10) Se il Cervico carcinoma si estende oltre la cervice, infiltrando l'endometrio, il parametrio, la vagina, senza interessare la pelvica, esso appartiene allo stadio:**
A) II a
B) II b
C) III b
D) III a
- 11) Il test di Schiller lascia scolorito l'epitelio:**
A) povero di glicogeno
B) ricco di glicogeno
C) infiammato
D) infetto da miceti
- 12) Nella reazione anafilattica si riscontrano manifestazioni di tipo:**
A) cutaneo, respiratorio, cardiovascolare
B) cutaneo, neurovegetativo, respiratorio
C) respiratorio, cutaneo, cardiovascolare, gastrointestinale
D) gastrointestinale, respiratorio, neurologico, cutaneo
- 13) Il metodo per misurare l'iperbilirubinemia del neonato a termine di gravidanza consiste nel misurare**
A) il livello di bilirubina serica totale e rapportare con l'età del neonato in ore
B) il livello di bilirubina serica totale e rapportare con l'età gestazionale e il peso del neonato
C) il livello di bilirubina serica totale rapportato al peso del neonato
D) il colorito della pelle con digitopressione
- 14) Durante la gravidanza esistono modificazioni a livello del sistema cardio-circolatorio**
A) la gittata cardiaca aumenta del 30-40%
B) la frequenza cardiaca aumenta di 10-15 battiti/minuto
C) il volume ematico aumenta del 30-40% circa
D) tutte le citate
- 15) Quale è il periodo migliore per praticare un corretto esame obiettivo della mammella:**
A) durante l'ovulazione
B) subito prima del flusso mestruale
C) subito dopo il flusso mestruale
D) non c'è un periodo migliore
- 16) Un Odds Ratio pari a 1 significa che**
A) lo studio della ricerca è ancora in corso
B) il gruppo trattato ha più efficacia dal trattamento che nel gruppo di controllo
C) lo studio della ricerca sperimentale è stato sospeso
D) l'evento si verifica nel gruppo trattato in ugual misura al gruppo di controllo
- 17) La correlazione tra il volume del liquido amniotico e il peso del feto scompare:**
A) dopo la 20a settimana
B) dalla 36a settimana
C) prima della 20a settimana
D) dopo la 40a settimana

4/8/22 DuoBetti'

4/8/22 Castellani Anna Maria

PROVA NON ESTRATTA

18) La decidua basale:

- A) è la parte di decidua posta immediatamente al di sotto della zona ove si è annidato l'embrione
- B) è la parte di decidua che ricopre la parte del sacco gestazionale verso la cavità uterina
- C) è la parte di decidua che ricopre la rimanente superficie della cavità uterina
- D) è la parte di decidua che rimane aderente alla placenta dopo il secondamento

19) Quale tra questi farmaci è utilizzato nel trattamento delle epilessie in gravidanza:

- A) alfa-metildopa
- B) metoclopramide
- C) carbamazepina
- D) interferone alfa

20) Con il segno di Kustner si verifica:

- A) l'avvenuto il distacco della placenta
- B) presenza di sproporzione feto pelvica
- C) la presenza della prima marcatura
- D) nessuna delle precedenti

21) WHO 2006. la Guida "Pregnancy, Childbirth and Post partum care: a Guide for essential practice", considera allertante una perdita ematica dai genitali in post-partum che intride un normale assorbente da puerperio

- A) in 15 minuti durante l'allattamento
- B) in 20 minuti dopo che la puerpera ha deambulato
- C) in 5 minuti, ed è continua
- D) in 30 minuti dopo che la puerpera ha allattato

22) Qual è il Livello di prova di efficacia di una Revisione Sistemica, senza bias, secondo SIGN:

- A) livello 1
- B) livello 2
- C) livello 3
- D) livello 4

23) Il danno neurologico nel pretermine:

- A) prevale nelle età gestazionali alte
- B) non dipende dall'età gestazionale ma da numerosi altri fattori
- C) è in funzione dell'età gestazionale
- D) tutte le precedenti

24) Il neonato è a rischio di varicella perinatale se la madre presenta varicella:

- A) da 5 giorni prima a 2 giorni dopo il parto
- B) da 7 giorni prima a 5 giorni dopo il parto
- C) da 2 giorni prima a 2 giorni dopo il parto
- D) è indipendente dal periodo

25) Se indicato, la vaccinazione in gravidanza è possibile

- A) solo se il vaccino è vivo
- B) contro la varicella
- C) contro la rosolia
- D) contro l'epatite B

26) Il tasso di trasmissione materno-infantile dell'HIV, una volta che vengano adottate le necessarie misure preventive, è pari a:

- A) 15% dei casi
- B) 10% dei casi
- C) 2% dei casi
- D) 5% dei casi



4/8/22 Anna Berti

4/8/22 Caterina Annarapu

PROVA NON ESTRATTA

27) Non è coinvolta nella lacerazione perineale di III grado la seguente struttura anatomica

- A) mucosa rettale
- B) mucosa vaginale
- C) cute perineale
- D) sfintere anale esterno

28) Le sanzioni disciplinari previste per l'Ostetrica\o dipendente di una Pubblica Amministrazione sono:

- A) censura, multa, sospensione, rimprovero scritto
- B) multa, sospensione, radiazione
- C) censura, sospensione, licenziamento
- D) rimprovero verbale, scritto, multa, sospensione, licenziamento

29) Secondo Greenwood 1957 le Professioni hanno alcune caratteristiche chiamate Attributi comuni. Essi sono:

- A) abilità superiore, autorità professionale, sanzione della comunità, competenza esclusiva
- B) codice deontologico, autorità professionale, sanzione della comunità, abilità superiore
- C) abilità superiore, autorità professionale, sanzione della comunità, codice di regole etiche, associazione professionale
- D) codice di regole etiche, autorità professionale, competenza esclusiva

30) La documentazione dell'assistenza alla donna in gravidanza ha la\e funzione\i

- A) definizione e identificazione di condizioni di rischio materno e fetale e\o di situazioni che richiedono la pianificazioni di interventi specifici
- B) comunicazione tra professionisti che assistono la donna, la progettazione di audit e di indagini epidemiologiche
- C) la raccolta di dati amministrativi
- D) tutte le precedenti



4/8/22 Anna Butti
4/8/22 Castellina Piana

PROVA NON ESTRATTA

ASST LARIANA

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO – OSTETRICA – CATEGORIA D

PROVA SCRITTA 3

1) IN BASE ALLE ATTIVITA' DI SEGUITO DESCRITTE INDICARE LA SEQUENZA CORRETTA RELATIVA AL LAVAGGIO STANDARD DELLE MANI:

- 1) bagnare le mani e i polsi con acqua preferibilmente tiepida mantenendo le mani più in basso dei gomiti;
- 2) applicare sulle mani la quantità di detergente necessaria a coprire tutte le superfici da detergere;
- 3) aprire il rubinetto con la mano, il gomito o il piede;
- 4) chiudere il rubinetto con il gomito, o, se manuale con la salvietta monouso;
- 5) sciacquare abbondantemente;
- 6) con movimenti rotatori energici, lavare i palmi ed il dorso delle mani, ogni dito e le aree interdigitali, le nocche, i polsi e gli avambracci, per almeno 15 secondi;
- 7) asciugare con asciugamani monouso, iniziando dalle dita e muovendosi verso gli avambracci, fino ad eliminare tutta l'umidità residua.

- A) 2 - 6 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7
B) 7 - 4 - 3 - 2 - 1 - 6 - 5
C) 1 - 6 - 7 - 3 - 2 - 5 - 4
D) 3 - 1 - 2 - 6 - 5 - 7 - 4

2) IN BASE ALLE AZIONI DI SEGUITO RIPORTATE, INDICARE LA SEQUENZA CORRETTA RIGUARDANTE LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI PER VIA ORALE:

- 1) valutare ogni singolo paziente e, quando necessario, effettuare i controlli preventivi necessari (rilevazione P.A., polso, segni di intolleranza...);
- 2) verificare la corretta prescrizione;
- 3) preparare i farmaci sul carrello senza toglierli dalle loro confezioni originali;
- 4) documentare l'avvenuta somministrazione;
- 5) controllare ancora una volta l'etichetta prima di portare al paziente il farmaco che deve assumere;
- 6) garantire la corretta applicazione delle "7 G" (giusto farmaco, giusto paziente, giusta dose, giusta via, giusto orario, giusta motivazione, giusta documentazione);
- 7) assicurarsi che il farmaco sia assunto dal paziente;
- 8) effettuare il lavaggio standard delle mani.

- A) 2 - 8 - 3 - 6 - 1 - 5 - 7 - 4
B) 5 - 7 - 8 - 2 - 3 - 4 - 1 - 6
C) 2 - 8 - 7 - 1 - 5 - 4 - 3 - 6
D) 8 - 4 - 5 - 3 - 2 - 1 - 6 - 7

3) IN BASE ALLE ATTIVITA' DI SEGUITO DESCRITTE INDICARE LA SEQUENZA CORRETTA DELLA RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE (R.C.P.):


- 1) valutare il respiro, polso e segni di circolo;
- 2) valutare se la vittima risponde;
- 3) iniziare il massaggio cardiaco;
- 4) posizionare correttamente il soggetto;
- 5) instaurare e mantenere la pervietà delle vie aeree;
- 6) attivare il sistema di soccorso;
- 7) erogare lo shock quando indicato;
- 8) collegare il DAE (defibrillatore automatico esterno) non appena possibile.

- A) 8 - 7 - 3 - 1 - 5 - 6 - 7 - 2
B) 2 - 6 - 4 - 5 - 1 - 3 - 8 - 7
C) 1 - 3 - 8 - 7 - 4 - 6 - 5 - 2
D) 7 - 1 - 8 - 2 - 4 - 5 - 6 - 3



4/8/22 Devo Buser
PROVA NON ESTRATTA
4/8/22 Castellani P.

- 4) Riguardo la sicurezza del neonato, quale affermazione è falsa?**
- A) il bambino dovrebbe essere sistemato con i piedi che toccano il fondo della culla
 - B) il dispositivo air-bag deve essere disattivato quando il seggiolino del neonato viene posto sul sedile anteriore
 - C) la posizione del neonato sul fianco aumenta il rischio di Sudden Infant Death Syndrome
 - D) la temperatura ambientale dovrebbe essere mantenuta attorno ai 22 gradi
- 5) SECONDO IL NATIONAL INSTITUTE for CLINICAL EXCELLENCE, NICE n° 55/ aggiornata 2008, RIGUARDO L'ASSISTENZA OSTETRICA IN TRAVAGLIO, QUALE AFFERMAZIONE E' FALSA?**
- A) durante il secondo stadio del travaglio dovrebbe essere eseguito il massaggio perineale per ridurre il trauma
 - B) durante il primo stadio del travaglio è raccomandato che l'Ostetrica\o rilevi ogni ora la frequenza
 - C) durante il primo stadio del travaglio è raccomandato che l'Ostetrica\o rilevi ogni ora la frequenza
 - D) nel primo stadio del travaglio l'Ostetrica\o rileva ogni 4 ore la temperatura corporea
- 6) SECONDO CDC (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION) IN TEMA DI SCREENING DEL TUMORE del COLLO DELL'UTERO, 2011, quale affermazione è falsa**
- A) in occasione del Pap Test non può essere effettuato il test HPV (papilloma virus umano)
 - B) se una donna fuma e ha test HPV (papilloma virus umano) positivo ha una maggior probabilità di ammalarsi di cancro del collo dell'utero
 - C) di ammalarsi di cancro del collo dell'utero
 - D) è raccomandato il vaccino contro HPV (papilloma virus umano) alle ragazze di 11-12 anni
- 7) SECONDO IL ROYAL COLLEGE of OBSTETRICIANS and GYNAECOLOGIST, RCOG N. 52\aggiornato 2011, RIGUARDO ALL'EMORRAGIA POST PARTUM, quale affermazione è falsa?**
- A) la profilassi ossitocica non dovrebbe essere offerta routinariamente nella gestione del terzo stadio del travaglio
 - B) il misoprostolo non è efficace quanto l'ossitocina, ma può essere utilizzato quando quest'ultima non è disponibile, come nel parto a domicilio
 - C) l'etnia asiatica è un fattore di rischio
 - D) la febbre durante il travaglio, dovrebbe consigliare una maggiore sorveglianza della donna
- 8) SECONDO LA LINEA GUIDA NICE (NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH and CLINICAL EXCELLENCE) N° 55 DEL 2007 RIGUARDO L'ASSISTENZA IN TRAVAGLIO E PARTO, IN MERITO ALLA RIDUZIONE DEL TRAUMA PERINEALE, quale affermazione è vera?**
- A) il massaggio perineale dovrebbe essere effettuato durante il secondo stadio del parto
 - B) sia la tecnica "hands on" che "hands poised" possono essere utilizzate per facilitare il parto
 - C) l'episiotomia dovrebbe essere effettuata di routine dopo una precedente lacerazione di 3° o 4° grado
 - D) in caso debba essere effettuata l'episiotomia, la tecnica raccomandata è l'incisione medio laterale che parta dalla forchetta e che si diriga a destra con un angolo compreso tra i 45° e 90° rispetto l'asse verticale
- 9) SECONDO LA LINEA GUIDA NICE (NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH and CLINICAL EXCELLENCE) N° 37a E 37b RIGUARDO AL TROMBOEMBOLISMO QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI E' ERRATA**
- A) il warfarin non è controindicato in allattamento al seno
 - B) per ridurre il rischio di sindrome post-trombotica, le calze elastiche a compressione graduata devono essere indossate sulla gamba colpita per 6 mesi - 1 anno dopo l'evento acuto, se il gonfiore persiste
 - C) l'eparina a basso peso molecolare è la scelta adeguata per la tromboprofilassi in gravidanza
 - D) la disidratazione è considerata un fattore di rischio



4/8/22 Elena Butti


4/8/22 Costantino Belli

PROVA NON ESTRATTA

10) IN BASE ALLE ATTIVITA' DI SEGUITO DESCRITTE, INDICARE LA SEQUENZA CORRETTA -FATTO SALVO L'EMOSTASI QUANDO NECESSARIO- RELATIVA AL TAGLIO CESAREO:

- 1) incisione segmento uterino inferiore;
- 2) apertura peritoneo viscerale;
- 3) sutura della breccia uterina;
- 4) sutura della cute;
- 5) apertura parete addominale;
- 6) secondamento;
- 7) scollamento della vescica;
- 8) chiusura del peritoneo parietale e fascia;
- 9) apertura peritoneo parietale;
- 10) estrazione del feto

- A) 5 - 2 - 9 - 7 - 1 - 10 - 6 - 3 - 8 - 4
B) 5 - 9 - 2 - 7 - 1 - 10 - 6 - 3 - 8 - 4
C) 5 - 2 - 7 - 9 - 1 - 10 - 6 - 3 - 8 - 4
D) 5 - 9 - 7 - 9 - 1 - 10 - 6 - 3 - 8 - 4



11) IN BASE ALLE AZIONI DI SEGUITO RIPORTATE, INDICARE LA SEQUENZA CORRETTA RIGUARDANTE LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI PER VIA INTRAMUSCOLARE:

- 1) verificare la corretta prescrizione;
- 2) se non si aspira sangue, iniettare la soluzione, ritirare l'ago e applicare una leggera pressione con un batuffolo sul sito di iniezione;
- 3) preparare i farmaci sul carrello senza toglierli dalle loro confezioni originali;
- 4) aspirare il farmaco dalla fiala o dal flaconcino ed avvicinarsi al letto del paziente;
- 5) fare assumere al paziente la posizione idonea ed identificare i punti di riferimento per l'area scelta per l'iniezione;
- 6) disinfettare il punto prescelto;
- 7) effettuare il lavaggio standard delle mani;
- 8) rimuovere il cappuccio dell'ago, introdurlo rapidamente;
- 9) documentare l'avvenuta somministrazione;
- 10) aspirare lentamente tirando indietro lo stantuffo per verificare che l'ago non sia in un vaso sanguigno

- A) 3 - 5 - 6 - 9 - 8 - 1 - 2 - 4 - 7 - 10
B) 5 - 8 - 2 - 3 - 4 - 1 - 6 - 7 - 9 - 10
C) 1 - 3 - 7 - 5 - 4 - 6 - 8 - 10 - 2 - 9
D) 1 - 3 - 7 - 5 - 4 - 6 - 8 - 10 - 2 - 9

12) CON RIFERIMENTO ALLA PREVENZIONE DEI DIFETTI DEL TUBO NEURALE, QUALE AFFERMAZIONE E' FALSA?

- A) la donna diabetica deve essere incoraggiata all'assunzione di 4-5 mcg/die di acido folico
B) l'assunzione di acido folico è considerata prevenzione primaria
C) insieme all'assunzione di acido folico è raccomandato l'assunzione di carciofi, asparagi, indivia, bieta e broccoli
D) l'acido folico è un folato sintetico che non si trova in natura

13) SECONDO LA RACCOMANDAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. 6 DEL 2008 IN MERITO ALLA PREVENZIONE PER LA MORTE MATERNA, INDICARE QUALE AFFERMAZIONE E' FALSA

- A) ogni atto sanitario deve essere preceduto e accompagnato da un'esauriente azione informativa
B) per la determinazione del profilo di rischio riportare nella documentazione clinica i fattori biologici, ma non i fattori sociali, come l'appartenenza a fedi religiose
C) la raccomandazione principale è quella di effettuare la valutazione del rischio trombotico in occasione di ogni contatto con la struttura ospedaliera, anche per aborti interni o interruzioni di gravidanza
D) alle puerpere considerate a basso rischio tromboembolico è richiesta solo la "mobilitazione precoce & agguerrita e attenzione allo stato di idratazione"

4/8/22 *Anna Bratti*
4/8/22 *Castelli Nicomede*

PROVA NON ESTRATTA

14) IN BASE ALLE AZIONI DESCRITTE DI SEGUITO, INDICARE LA SEQUENZA CORRETTA RIGUARDANTE LA CATETERIZZAZIONE A PERMANENZA NELLA DONNA:

- 1) togliere i guanti e lavare le mani;
 - 2) far assumere alla paziente la posizione dorsale con le ginocchia flesse;
 - 3) effettuare un lavaggio antisettico delle mani ed indossare i guanti;
 - 4) preparare il materiale per la cura igienica della paziente e il kit per la cateterizzazione;
 - 5) con la mano non dominante divaricare le grandi labbra ed identificare il meato urinario;
 - 6) gonfiare il palloncino di ancoraggio con acqua distillata;
 - 7) posizionare la sacca di raccolta al di sotto della vescica;
 - 8) eseguire un'accurata igiene perineale della paziente;
 - 9) collegare il catetere alla sacca di raccolta e fissarlo con cerotto alla coscia;
 - 10) lubrificare la punta del catetere;
 - 11) inserire il catetere nel meato urinario e introdurlo fino a che non defluiscano le urine
- A) 4 - 2 - 8 - 3 - 10 - 5 - 11 - 6 - 9 - 7 - 1
B) 1 - 10 - 11 - 2 - 8 - 4 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9
C) 2 - 4 - 7 - 8 - 5 - 10 - 3 - 11 - 1 - 6 - 9
D) 4 - 5 - 7 - 10 - 8 - 2 - 3 - 11 - 1 - 6 - 9

15) IN BASE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI AD UNA DONNA, QUALE AFFERMAZIONE E' FALSA?

- A) l'ostetrica è autorizzata in totale autonomia a segnalare per scritto una sospetta reazione avversa di un farmaco al Responsabile della Farmacovigilanza
B) in caso di somministrazione di un farmaco in fase di sperimentazione è necessaria l'autorizzazione del Comitato di Bioetica
C) le donne a rischio tromboembolico che assumono warfarin possono continuare l'allattamento al seno sottoponendosi a controlli frequenti dell'INR (International Normalized Ratio)
D) la partecipazione delle donne a studi sperimentali su farmaci è alta

16) IN MERITO ALLE POSIZIONE MATERNE IN TRAVAGLIO DI PARTO, INDICARE QUALE AFFERMAZIONE E' FALSA

- A) la posizione semiprona favorisce la rotazione dell'occipite posteriore in occipite anteriore
B) la posizione eretta allinea il feto con l'ingresso pelvico
C) la posizione genupetturale è tra le prime procedure da attuare tempestivamente nel prolasso di funicolo
D) la posizione accovacciata favorisce la progressione della parte presentata se la stessa è a livello -1

17) I tre Fenomeni del Parto sono

- A) materni, dinamici, plastici
B) dinamici, meccanici, plastici
C) materni, meccanici, dinamici
D) materni, plastici, fetali

18) Il Trattamento Attivo del 3° stadio del parto prevede

- A) uso ossitocici
B) uso uterotonici + trazione controllata e clampaggio precoce del funicolo
C) uso di ossitocici + la manovra di Brand-Andrews
D) manovra di Kustner

19) Una gravida con "Rh negativo" deve essere sottoposta a

- A) test di Coombs indiretto
B) test di Coombs diretto
C) ricerca anticorpi anti-A e anti-B
D) ricerca anticorpi anti-A e anti-B e test di Coombs diretto

20) La chlamidya Trachomatis è

- A) un virus
B) un batterio intracellulare obbligato
C) causa di sepsi neonatale
D) protozoo



4/8/22 Anna Butts
4/8/22 Castellini

PROVA NON ESTRATTA



21) Con il segno di AHLFELD si valuta:

- A) l'avvenuto distacco della placenta
- B) la reattività del neonato
- C) la presentazione fetale
- D) la progressione della parte presentata

22) L'incisione episiotomica deve essere eseguita:

- A) durante la pausa tra le contrazioni uterine
- B) quando la parte presentata affiora alla rima vulvare di 2-3 cm durante la pausa delle contrazioni
- C) quando è possibile incidere il muscolo trasverso profondo
- D) quando la parte presentata ha già disteso il muscolo bulbo cavernoso

23) SNLG 2010. L'Ostetrica deve informare la donna in gravidanza

- A) che la supplementazione con vitamina A deve essere evitata
- B) che la supplementazione di vitamina A deve essere raccomandata
- C) che la supplementazione di vitamina D è raccomandata in donne che non si espongono al sole
- D) nessuna affermazione è corretta

24) Si distinguono le seguenti presentazioni:

- A) 4 cefaliche + 1 podalica + 1 spalla
- B) 1 cefalica + 1 podalica + 1 spalla
- C) 1 cefalica + 1 trasversa + 1 spalla
- D) 1 vertice + 1 fronte + 1 podalica + 1 spalla

25) Qual è l'incidenza dei neonati con Ph < 7 riportata come indicatore di riferimento?

- A) 0.1 %
- B) 0,2 - 0,5 %
- C) 0,3 - 0,7 %
- D) 1%

26) Qual è il valore di INDICATORE ATTESO per i trigger materni in area ostetrica?

- A) 1%
- B) 3%
- C) 5%
- D) 10%

27) Lo screening prenatale della Rosolia

- A) al primo controllo e se negativo ogni 4/6 settimane fino al parto
- B) al primo controllo e se negativo ripetuto alla 17 settimana
- C) al primo controllo e se positivo ripetuto alla fine della gravidanza
- D) Nessuna delle precedenti

28) Infezione da CMV in gravidanza: Indica quale delle seguenti affermazioni NON è corretta

- A) il rischio di trasmissione è influenzato dall'epoca di gravidanza
- B) il rischio di trasmissione è minore in caso di infezione NON primaria
- C) il rischio di sintomi /sequele è uguale in caso di infezione primaria e non primaria
- D) il fenotipo clinico dipende dalla viremia materna

29) La sacca contenete sangue del cordone ombelicale deve essere consegnata alla Banca:

- A) entro 72 ore dalla raccolta
- B) entro 48 ore dalla raccolta
- C) entro 42 ore dalla raccolta
- D) entro 24 ore dalla raccolta

30) Dove sono definiti i criteri di selezione della coppia per la Donazione Allogena del sangue cordonale unrelated?

- A) nell'Accordo Stato-Regioni 20/04/2011 "Linee Guida per l'Accreditamento della Banche di sangue Cordonale"
- B) Negli Standards Internazionali Netcord - Fact
- C) Decreto 02/11/2015 " Disposizioni Relative ai Requisiti di Qualità e sicurezza del sangue e degli Emocomponenti"
- D) Nessuna delle precedenti

PROVA NON ESTRATTA

4/8/22 Anna Patti
4/8/22 Castellani Anamaria

ASST LARIANA

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO – OSTETRICA – CATEGORIA D



PROVA PRATICA 1

- 1) La sacca contenete sangue del cordone ombelicale deve essere consegnata alla Banca:**
 - A) entro 72 ore dalla raccolta
 - B) entro 48 ore dalla raccolta
 - C) entro 42 ore dalla raccolta
 - D) entro 24 ore dalla raccolta

- 2) In caso di donazione dedicata del sangue da cordone ombelicale:**
 - A) non c'è contatto diretto tra la banca di sangue cordonale e la famiglia o altre persone
 - B) c'è contatto diretto tra la banca di sangue cordonale e la famiglia o altre persone
 - C) i contatti tra la Banca e il Centro di Raccolta sono mediati dalla Direzione Sanitaria
 - D) è previsto un contatto tra banca, direzione sanitaria e famiglia

- 3) Dove sono definiti i criteri di selezione della coppia per la Donazione Allogena del sangue cordonale unrelated?**
 - A) nell'Accordo Stato-Regioni 20/04/2011 "Linee Guida per l'Accreditamento della Banche di sangue Cordonale"
 - B) negli Standards Internazionali Netcord – Fact
 - C) nel Decreto 02/11/2015 " Disposizioni Relative ai Requisiti di Qualità e sicurezza del sangue e degli Emocomponenti"
 - D) in nessuna delle precedenti


- 4) Le pazienti con BMI > a 30 hanno contrazioni meno frequenti ed efficaci per:**
 - A) disattivazione dei canali del K e aumento delle Gap iunzion miometriali
 - B) bassi livelli di FFA
 - C) ridotta espressione dei recettori dell'ossitocina a livello miometriale
 - D) tutte le precedenti

- 5) L'igiene e la sanificazione ambientale rivestono un importante ruolo nella lotta alle Infezioni Correlate alle Pratiche Assistenziali. Quale delle seguenti affermazioni non è corretta?**
 - A) le modalità di esecuzione delle pulizie e la loro frequenza variano a secondo delle diverse aree ospedaliere
 - B) una disinfezione di qualità non può avvenire senza una preliminare accurata detersione
 - C) è opportuno disinfettare di routine le superfici ambientali
 - D) i microrganismi contaminano molto frequentemente le superfici ambientali

- 6) Il lavaggio sociale delle mani: quale tra le seguenti è la tempistica per una corretta esecuzione?**
 - A) 30-60 secondi
 - B) almeno 20 secondi
 - C) 40-60 secondi
 - D) 15-45 secondi

- 7) In caso di paziente affetto da Clostridium difficile, quale tra le seguenti modalità di igiene mani non è efficace per le spore?**
 - A) lavaggio antisettico
 - B) lavaggio chirurgico
 - C) frizione con gel idroalcolico
 - D) lavaggio sociale

4/18/22
4/18/22
PROVA NON ESTRATTA



8) Qual' è la peculiarità del Droplet?

- A) sono goccioline con diametro < 5micron
- B) decadono entro il metro
- C) fluttuano nell'aria
- D) sono goccioline con diametro > 5micron

9) Definizione di ICPA - Infezioni Correlate alle Pratiche Assistenziali -:

- A) l'infezione che si verifica in un paziente durante il processo assistenziale in ospedale o in altra struttura sanitaria e che non era manifesta né in incubazione al momento del ricovero
- B) l'infezione che si verifica in un paziente durante il processo assistenziale in ospedale o in altra struttura sanitaria e che non era manifesta ma in incubazione al momento del ricovero
- C) l'infezione che si verifica in un paziente prima dell'accesso durante in ospedale o in altra struttura sanitaria
- D) nessuna delle precedenti

10) Il detrusore è innervato dai nervi

- A) ipogastrici e pelvici
- B) nessuna delle precedenti
- C) ipogastrici
- D) pelvici

11) In quale dei seguenti casi un obiettore di coscienza, è tenuto obbligatoriamente a partecipare, per quanto di sua competenza ad interventi di interruzione di gravidanza:

- A) solo quando è richiesto dal direttore sanitario
- B) solo quando richiesto dalla donna
- C) quando è richiesto dal ginecologo
- D) solo quando il proprio intervento è indispensabile per salvare la vita della donna

12) I fattori di rischio legati allo sviluppo di neoplasia dell'endometrio possono essere distinti in diverse categorie, tra cui:

- A) fattori genetici e comportamentali
- B) fattori ambientali, ormonali, eredo familiari
- C) fattori ormonali e sistemici
- D) nessuna delle precedenti

13) Secondo le Ig nazionali sulla emorragia post partum, per emorragia post partum maggiore, si intende una perdita stimata:

- A) < 500 ml
- B) uguale a 1000 ml
- C) tra 500 e 1000 ml
- D) > 1000

14) Secondo il dm 740/94 (art. 1), le competenze dell'ostetrica, trovano riscontri positivi presso gli ambulatori per gravidanze a basso rischio a gestione ostetrica, perché la stessa:

- A) assiste la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio
- B) partecipa ai programmi di assistenza materna e neonatale
- C) conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità
- D) tutte le precedenti

15) La lunghezza media di un neonato è:

- A) 35 cm
- B) 40 cm
- C) 50 cm
- D) 55 cm

16) In quale piano sanitario nazionale l'area materno infantile è stata inserita tra quelle prioritarie

- A) 1999/2001
- B) 1998-2000
- C) 1997/1999
- D) Nessuno di questi

PROVA NON ESTRATTA
4/8/22 Giulia Ubbia
4/8/22 Ferencz



17) Il nucleo fibroso è situato:

- A) tra l'ano e la vulva
- B) sotto la vescica
- C) tra la vulva e il meato urinario
- D) posteriormente all'ano

18) Quali tra questi è un "fenomeno plastico" del parto?

- A) formazione della borsa amniocoriale
- B) progressione
- C) distensione della vagina e del perineo
- D) nessuna delle precedenti

19) Un neonato che presenta alla nascita una respirazione caratterizzata da inspirazioni profonde forzate, espirazioni rapide e geme, manifesta il respiro di:

- A) grocco
- B) biot
- C) nessuna delle precedenti
- D) kussmaul

20) Nel primo trimestre di gravidanza si può porre diagnosi di diabete pre gestazionale se il valore della glicemia a digiuno è:


- A) ≥ 120 mg/dl
- B) ≥ 126 mg/dl
- C) ≥ 92 mg/dl
- D) non è indicativo

PROVA NON ESTRATTA

4/8/22 Giulia Ussia
4/8/22 Serena Riccio

ASST LARIANA

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO – OSTETRICA – CATEGORIA D



PROVA PRATICA 2

- 1) **L'informativa e il consenso per il trattamento dei dati personale per la donazione allogenica di sangue cordonale e per l'uso delle unità non idonee per il trapianto a scopo di ricerca deve essere sottoscritto:**
- A) prima di raccogliere il consenso informato per la raccolta e conservazione allogenica del sangue cordonale e per l'uso delle unità non idonee per il trapianto a scopo di ricerca
 - B) prima di raccogliere l'anamnesi
 - C) prima di effettuare la raccolta del sangue cordonale
 - D) tutte le precedenti
- 2) **In caso di paziente affetto da Clostridium difficile, quale tra le seguenti modalità di igiene mani non è efficace per le spore?**
- A) lavaggio antisettico
 - B) lavaggio chirurgico
 - C) frizione con gel idroalcolico
 - D) lavaggio sociale
- 3) **L'ammissione al travaglio, in assenza di controindicazioni specifiche, deve essere offerta a tutte le donne che hanno già partorito mediante taglio cesareo, ma in caso di induzione bisogna considerare che il rischio di rottura d'utero:**
- A) raddoppia con l'utilizzo di ossitocina
 - B) aumenta con l'aumentare del BMI
 - C) si riduce con l'aumentare dell'epoca gestazionale
 - D) non è influenzato dall'induzione
- 4) **Da che epoca di gravidanza è raccomandato misurare la pressione arteriosa 1 volta alla settimana**
- A) 24 settimane
 - B) 28 settimane
 - C) 32 settimane
 - D) 36 settimane
- 5) **Quale risulta essere la migliore temperatura dell'acqua da utilizzare durante il lavaggio delle mani?**
- A) particolarmente calda al fine di abbattere la carica batterica
 - B) fredda
 - C) non ha alcuna rilevanza al fine di abbattere la flora residente o transitoria
 - D) dipende dal tipo di lavaggio mani che sto effettuando (sociale, antisettico o chirurgico)
- 6) **La sacca contenete sangue del cordone ombelicale deve essere consegnata alla Banca:**
- A) entro 72 ore dalla raccolta
 - B) entro 48 ore dalla raccolta
 - C) entro 42 ore dalla raccolta
 - D) entro 24 ore dalla raccolta
- 7) **In caso di isolamento da CONTATTO cosa si predispone all'ingresso della camera?**
- A) camici monouso, guanti sterili, gel idroalcolico
 - B) camici monouso, calzari, maschera chirurgica

PROVA NON ESTRATTA

4/8/22 Giulia M...
4/8/22 Serena P...

- C) camici monouso, guanti, gel idroalcolico
- D) camici monouso, guanti, facciale filtrante

8) Definizione di colonizzazione:

- A) presenza di microrganismi che crescono e si moltiplicano attivamente, con evidenti manifestazioni cliniche o reazioni immunitarie obiettivabili
- B) presenza di microrganismi che crescono e si moltiplicano attivamente, senza evidenti manifestazioni cliniche o reazioni immunitarie obiettivabili
- C) assenza di microrganismi che crescono e si moltiplicano attivamente
- D) nessuna delle precedenti

9) Quale risulta essere il germe più frequentemente responsabile di ICPA -Infezioni Correlate alle Pratiche Assistenziali-?

- A) Klebsiella pneumoniae
- B) Escherichia coli
- C) Serratia
- D) Staphylococcus aureus

10) L'indagine migliore per diagnosticare un difetto del tubo neurale è:

- A) dosaggio dell'alfa-fetoproteina
- B) amniocentesi
- C) dosaggio della gonadotropina corionica
- D) ecografia



11) Qual è il maggior diametro della testa fetale?

- A) diametro occipito - frontale
- B) diametro bitemporale
- C) diametro vertice bregmatico
- D) diametro bi parietale

12) Le ossa parietali sono unite all'osso occipitale attraverso la sutura:

- A) lambdoidea
- B) biparietale
- C) frontale
- D) sagittale

13) Il corpo luteo raggiunge la massima attività:

- A) durante l'ovulazione
- B) 15 giorni dopo l'ovulazione
- C) una settimana dopo l'ovulazione
- D) una settimana prima dell'ovulazione

14) In un caso di ipotiroidismo in gravidanza si riscontrerà il seguente quadro ematologico:

- A) basso tasso di TSH e riduzione di T3 e T4
- B) alto tasso di TSH e riduzione di T3 e T4
- C) TSH normale e riduzione di T3 e T4
- D) nessuna delle risposte indicate

15) L'atresia esofagea è una delle più comuni patologie congenite. Sovente si riscontra l'associazione di questa affezione con:

- A) polidramnios
- B) anomalie congenite cardiache
- C) anomalie congenite gastro intestinali
- D) tutte le risposte indicate (A+B+C)

16) La pillola estro-progestinica agisce soprattutto (ai fini contraccettivi) a livello di

- A) surrene
- B) ipofisi
- C) ovaio
- D) tuba

PROVA NON ESTRATTA

4/18/22
4/21/22

Globa Missia
Serena Fiodori



17) La trasmissione verticale di una infezione è quella che si realizza:

- A) durante gli ultimi 6 mesi di gravidanza
- B) durante i primi 3 mesi di gravidanza
- C) al momento del parto
- D) tutte le risposte sono giuste

18) Il verificarsi del ciclo mestruale dipende da:

- A) dal rilascio di prolattina da parte dell'ipofisi anteriore
- B) dalla lunghezza variabile della fase follicolare
- C) dalla secrezione pulsatile dell'ormone stimolante la secrezione di gonadotropine (GnRH)
- D) perdita ematica

19) Il virus dell'herpes penetra nell'organismo attraverso:

- A) via placentare dalla madre al feto
- B) via genitale
- C) ingestione di ovocisti contenuti nelle carni crude o nelle feci dei gatti
- D) trasfusione di sangue

20) Quando andrebbe iniziata l'analgesia nel travaglio di parto?

- A) Quando la dilatazione cervicale ha raggiunto 3-4 cm
- B) Prima che inizino le contrazioni
- C) Durante il periodo prodromico
- D) Dopo i 6 cm

PROVA NON ESTRATTA

4/8/22 Giulia M...
4/2/22 Elena N...

ASST LARIANA

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO – OSTETRICA – CATEGORIA D

PROVA PRATICA 3

- 1) **Da che epoca di gravidanza è raccomandato misurare la pressione arteriosa 1 volta alla settimana**
 - A) 24 settimane
 - B) 28 settimane
 - C) 32 settimane
 - D) 36 settimane

- 2) **In caso di gravidanza con pap test anomalo e riscontro alla colposcopia di HSIL è indicato:**
 - A) ripetizione del pap test 1 volta per trimestre e dopo 40 giorni dal parto
 - B) ripetizione del pap test nel terzo trimestre e 3 mesi dopo il parto
 - C) colposcopia ogni 4 settimane
 - D) colposcopia dopo 40 giorni dal parto

- 3) **In caso di paziente affetto da Clostridium difficile, quale tra le seguenti modalità di igiene mani non è efficace per le spore?**
 - A) lavaggio antisettico
 - B) lavaggio chirurgico
 - C) frizione con gel idroalcolico
 - D) lavaggio sociale

- 4) **L'ipossia intrapartum è definita da almeno 1 dei seguenti criteri**
 - A) Apgar score inferiore o uguale a 5 a 10 minuti di vita
 - B) necessità di proseguire la rianimazione con tubo endotracheale o maschera dopo 10 minuti dal parto
 - C) acidosi neonatale (ph inferiore a 7 e/o BE superiori o uguali a 12 mmol/L
 - D) corretti tutti i precedenti

- 5) **Dove sono definiti i criteri di selezione della coppia per la Donazione Allogena del sangue cordonale unrelated**
 - A) nell'Accordo Stato-Regioni 20/04/2011 "Linee Guida per l' Accredimento delle Banche di sangue Cordonale"
 - B) negli Standards Internazionali Netcord – Fact
 - C) nel Decreto 02/11/2015 " Disposizioni Relative ai Requisiti di Qualità e sicurezza del sangue e degli Emocomponenti"
 - D) dall'AIFA

- 6) **Quali sono le possibili vie di trasmissione di infezioni?**
 - A) paziente-paziente
 - B) paziente-operatore
 - C) ambiente circostante contaminato
 - D) tutte le precedenti

- 7) **Precauzioni standard: quale non è una precauzione standard?**
 - A) lavaggio mani
 - B) igiene respiratoria
 - C) utilizzo di dispositivi di protezione individuali (DPI)
 - D) isolamento da droplet



4/8/22 Giulia Maria
PROVA ESTRATTA 4/8/22 Serena Riccio

8) A chi si applicano le Precauzioni Standard?

- A) nei confronti dei pazienti in isolamento
- B) nei confronti di tutti i pazienti che ricevono assistenza in ospedale
- C) nei confronti di tutti i pazienti sottoposti a manovre invasive
- D) nei confronti di tutti i pazienti ai quali è stato isolato un germe multi resistente

9) In caso di paziente in isolamento da Contatto, le stoviglie devono:

- A) essere monouso
- B) essere pluriuso e lavate separatamente ad una temperatura superiore ai 90°C
- C) essere pluriuso e dedicate al paziente durante tutto il ricovero
- D) essere pluriuso e lavate come consueto insieme alle altre stoviglie

10) Che cosa s'intende con "menorragia"?

- A) presenza di sangue nelle urine
- B) flusso sanguigno mestruale troppo abbondante
- C) perdite biancastre maleodoranti
- D) perdite vaginali liquide

11) La HELLP rappresenta una complicanza di:

- A) ipertensione gestazionale
- B) diabete gestazionale
- C) parto pretermine
- D) aumento superiore a 15 KG a termine di gravidanza

12) Secondo l'indice di Apgar, subito dopo il parto, il neonato è valutato normale se tale indice è compreso tra:

- A) 4-6
- B) 0-3
- C) 7-10
- D) 5- 9

13) Quale è il rischio di una crescita e sviluppo anomalo del feto in seguito all'amniocentesi?

- A) 0,035
- B) 0,05
- C) 0
- D) 0,01

14) Quale è il periodo più suscettibile agli agenti teratogeni?


- A) il momento immediatamente successivo al parto
- B) il periodo che va dai 2 ai 6 mesi del neonato
- C) il periodo embrionale
- D) allattamento

15) Qual è l'estrogeno utilizzato nella contraccezione ormonale?

- A) estriolo
- B) etinilestradiolo
- C) raloxifene
- D) tamoxifene

16) Una donna di 30 anni ha paura di sviluppare una neoplasia ovarica. Sua nonna di 70 anni è recentemente deceduta di carcinoma ovario. Si discute con lei i fattori di rischio e la prevenzione della neoplasia ovarica. Quale delle seguenti può ridurre il rischio per l'insorgenza di una neoplasia ovarica?

- A) uso di farmaci anti-infiammatori non-steroidi
- B) uso di una terapia combinata di contraccettivi orali
- C) menopausa dopo l'età di 55 anni
- D) nessuna delle precedenti



PROVA ESTRATTA

4/8/22
Giulia Ussia
4/8/22 Serena Piccini

17) Dal punto di vista legale il medico o l'ostetrica che ha assistito al parto ha l'obbligo di sorvegliare personalmente la puerpera:

- A) per tutta la durata del travaglio e del parto
- B) dal parto alla prima settimana dopo parto
- C) nel corso delle due ore del post-partum
- D) per tutto il periodo della degenza

18) Il fattore maschile incide come causa di sterilità:


- A) nel 35-45% delle coppie sterili
- B) in meno del 10% delle coppie sterilità
- C) nel 20-25% delle coppie sterilità
- D) in più del 50% delle coppie sterili

19) Identifichi quale delle funzioni dell'agenda del percorso nascita sotto riportate è falsa:

- A) accertare e confermare a posteriori la normale evoluzione della gravidanza;
- B) identificare le condizioni materne, fetali e neonatali che deviano dalla normalità per consentire ai professionisti di offrire alle donne il percorso assistenziale individuale (PAI) appropriato;
- C) facilitare la comunicazione tra i/le professionisti/e che assistono la donna, la progettazione di audit, di indagini epidemiologiche e la raccolta di dati amministrativi;
- D) consentire la tracciabilità, per le diverse attività assistenziali diagnostico-terapeutiche svolte, di responsabilità delle azioni, cronologia delle stesse, modalità della loro esecuzione

20) Il numero di ecografie in gravidanza, secondo il rapporto ceDAP 2015, è pari a:

- A) 5,47 (gravidanza fisiologica)-5,45 (gravidanza patologica);
- B) 7,4 (gravidanza fisiologica)-5,45 (gravidanza patologica);
- C) 10 (gravidanza patologica) 7,4 (gravidanza fisiologica);
- D) >a 15 (gravidanza patologica)-5,45 (gravidanza fisiologica)




4/8/22 Giulia Maria
4/8/22 Serena Nicolai
PROVA ESTRATTA

PROVA ORALE N. 1

Cosa si intende per allattamento a richiesta?

Cosa è un mouse?

Buongiorno! Io sono l'ostetrica. Benvenuta! Come stai?




PROVA ORALE N. 2

Quali consigli daresti per risolvere un ingorgo mammario?

Come si chiama il programma di scrittura per eccellenza di un computer?

Buongiorno io sono l'ostetrica e ti assisterò al parto.



PROVA ORALE N. 3



Cosa è il colostro?

Come si chiama una tipica connessione ad internet "mobile"?

Dichiara la data di oggi in inglese / francese

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di:

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – OSTETRICA – CATEGORIA D

1. La Commissione ha preso atto che dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- a) 30 punti per i titoli;
- b) 70 per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 20 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: punti 15;
- b) titoli accademici e di studio: punti 2;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
- d) curriculum formativo e professionale: punti 10.

4. Titoli di carriera:

I titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti.

In particolare la Commissione ha deciso di attribuire:

- a) per il servizio reso nel corrispondente profilo, o in qualifiche corrispondenti, della categoria D, punti 1,200 per anno;
- b) per il servizio reso nel corrispondente profilo, o in qualifiche corrispondenti, della categoria superiore Ds, punti 1,500 per anno;
- c) per il servizio reso nel corrispondente profilo, o in qualifiche corrispondenti, della categoria D, se si evince il conferimento delle funzioni di coordinamento, punti 1,500 per anno;
- d) per il servizio reso nel corrispondente profilo, o in qualifiche corrispondenti, della categoria superiore Ds, se si evince il conferimento delle funzioni di coordinamento, punti 1,800 per anno;
- e) per il servizio militare / civile con funzioni inerenti punti 1,200 per anno;
- f) per il servizio militare / civile non in funzioni inerenti punti 0,600 per anno;

5. Titoli accademici e di studio:

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla Commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

In particolare la Commissione ha deciso di valutare:

- laurea specialistica/magistrale di ambito sanitario
- altre lauree di ambito sanitario
- master per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie
- master universitari di durata almeno annuale

Publicazioni e titoli scientifici:

1. la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, alla importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori.
2. la Commissione deve, peraltro, tenere conto ai fini di una corretta valutazione:
 - a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
 - b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire

Curriculum formativo e professionale:

1. nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti Pubblici;
2. in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
3. il punteggio attribuito dalla Commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato.

La Commissione prende atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 220/2001 la determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove d'esame e che la valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta va effettuata prima della correzione della prova stessa.

La Commissione procede, pertanto, alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli. Decide di valutare in particolare le seguenti attività:

1. Partecipazioni a congressi, convegni, corsi di aggiornamento attinenti al profilo professionale:
 - in qualità di relatore o docente
 - in qualità di tutor
 - in qualità di uditore di durata inferiore a sette giorni
 - in qualità di uditore di durata superiore a sette giorni
 - in qualità di uditore con esami finali
2. Servizio prestato a seguito di assegnazione di borsa di studio post-laurea in rapporto all'impegno orario;
3. Corsi di lingua o informatica;
4. Corsi di perfezionamento e specializzazione;
5. Attività didattica presso corsi universitari di laurea o presso corsi per il personale del Servizio Sanitario Nazionale;
6. Attività di tutoraggio presso corsi universitari di laurea o presso corsi per il personale del Servizio Sanitario Nazionale;
7. Attività prestata come libero professionista nella qualifica a concorso presso Amministrazioni pubbliche, in rapporto all'impegno orario;

8. Attività prestata come libero professionista nella qualifica a concorso con funzioni di coordinamento presso Amministrazioni pubbliche, in rapporto all'impegno orario;
9. Attività prestata come dipendente o come libero professionista nella qualifica a concorso presso enti privati anche all'estero, in rapporto all'impegno orario;
10. Attività prestata come dipendente o come libero professionista nella qualifica a concorso con funzioni di coordinamento presso enti privati anche all'estero, in rapporto all'impegno orario;
11. Stage o frequenza volontaria post – laurea presso strutture ospedaliere o universitarie, enti privati anche all'estero, in rapporto all'impegno orario.

La Commissione si attiene ai seguenti principi:

- per quanto riguarda la valutazione dei titoli sono applicate le norme generali di cui agli artt. n. 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001;
- i servizi saranno valutati fino alla data indicata nell'autocertificazione rilasciata dai candidati e per quanto riguarda i servizi svolti dal candidato a tempo parziale (part-time) i relativi punteggi saranno ridotti in percentuale;
- i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
- il computo matematico del punteggio verrà riportato fino alla terza cifra decimale, cioè in millesimi;
- qualora nelle dichiarazioni prodotte dai candidati non sia specificata la posizione funzionale, la qualifica e il datore di lavoro relativi al servizio dichiarato il servizio stesso non verrà valutato;
- il servizio dichiarato verrà valutato solo se è chiaramente specificato il relativo impegno orario;
- per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate sono calcolate dal 31 dicembre del primo anno al 1° gennaio dell'ultimo anno mentre le mensilità sono calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- non sono valutati attestati laudativi;
- sono oggetto di valutazione i titoli prodotti ovvero autocertificati nei casi, nei limiti e con le procedure previste dalla normativa vigente;
- per quanto concerne la valutazione dei titoli accademici e di studio e delle pubblicazioni e titoli scientifici la Commissione si attiene ai criteri precisati nel citato D.P.R. n. 220/2001 - art. 11. Saranno oggetto di valutazione solo le pubblicazioni edite a stampa e allegate alla domanda di partecipazione. Non sono, pertanto, oggetto di valutazione le pubblicazioni dichiarate e non documentate;
- per quanto riguarda il curriculum formativo e professionale dei candidati la Commissione procede alla valutazione del medesimo secondo le indicazioni stabilite dal predetto art. 11 del D.P.R. n. 220/2001. A tale proposito la Commissione precisa che vengono valutati esclusivamente i titoli formalmente documentati o autocertificati con le procedure di legge e non quelli soltanto descritti nel curriculum.

PROVA SCRITTA

Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 220/2001, la Commissione ha predisposto una terna di questionari a risposta multipla inerenti materie attinenti al profilo oggetto del concorso, denominati PROVA SCRITTA 1; PROVA SCRITTA 2 e PROVA SCRITTA 3, contenenti n. 30 quesiti ciascuno.

La Commissione, all'unanimità, determina di attribuire ad ogni risposta esatta un punto e che, quindi, per ottenere la sufficienza nella prova scritta il numero di risposte esatte dovrà corrispondere a 21.

PROVA PRATICA

La Commissione ha predisposto una terna di questionari a risposta multipla, che si allegano quali parti integranti al presente verbale, concernenti tecniche specifiche connesse al profilo oggetto del concorso e denominati PROVA PRATICA 1, PROVA PRATICA 2 e PROVA PRATICA 3, contenenti n. 20 quesiti ciascuno.

La Commissione ha stabilito di attribuire ad ogni risposta esatta un punto e che, quindi, per ottenere la sufficienza nella prova pratica il numero di risposte esatte dovrà corrispondere a 14.

PROVA ORALE

La Commissione stabilisce, inoltre, i criteri e le modalità di valutazione della prova orale, ai fini della motivazione dei punteggi attribuiti, come di seguito specificato:

- verifica della conoscenza su quesito specifico e capacità di inquadramento del